

Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Klinik I für Innere Medizin & CECAD, Sibylle C. Mellinghoff, Clara Lehmann, Oliver A. Cornely



UNIKLINIK
KÖLN



Impfung	Erkrankung	Mögliche Zeitpunkte			Indikation
		vor Therapie	während Therapie	nach Therapie	
COVID-19	jede	jederzeit			➤ Ungeimpft? Impfen! Grundimmunisierung plus 2 Booster (je frühestens 4 Mo. nach Infektion oder jüngster Impfung). Auch bei B-Zell-Depletion
Influenza	jede	1. Wahl	2. Wahl		➤ Ungeimpft? Impfen! Jährlich im Sept/Okt
Pneumokokken	jede	1. Wahl	2. Wahl		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ungeimpft? Impfen mit PCV und nach 6 Monaten PPSV23 ➤ Geimpft nur mit PPSV23? vor <6 Jahren: Impfen mit PCV (12 Mo. Abstand) vor >6 Jahren: analog ungeimpft ➤ Geimpft nur mit PCV? Impfen mit PPSV23 (6 Mo. Abstand) ➤ Vollständig geimpft? PPSV23 alle 6 Jahre <p style="text-align: center;">PCV20 statt PCV13, wenn verfügbar</p>
RSV	jede	1. Wahl	2. Wahl		➤ Ungeimpft? Impfen! Jährlich im Sept/Okt wiederholen
Herpes Zoster	jede	1. Wahl	2. Wahl		➤ Ungeimpft? Impfen , wenn seit 12 Monaten kein Herpes Zoster. Einmalige Booster-Impfung nach 2 Monaten

Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Klinik I für Innere Medizin & CECAD, Sibylle C. Mellinghoff, Clara Lehmann, Oliver A. Cornely



UNIKLINIK
KÖLN



Impfung	Erkrankung		Mögliche Zeitpunkte			Indikation
	Maligne hämatologische Erkrankungen	Solide Tumore	vor Therapie	während Therapie	nach Therapie	
Diphtherie Tetanus Pertussis Poliomyelitis	X	X	1. Wahl	2. Wahl		Bei inkomplettem Impfstatus ➤ Geimpft? Vor >10 Jahren: Impfung wiederholen ➤ Ungeimpft? Impfen!
Hepatitis A/B	X	X	1. Wahl	2. Wahl		Nur, wenn Impfstatus inkomplett oder Auffrischung indiziert Impfung wiederholen bei Anti-HBs <100 IE/L
Haemophilus influenzae	nach allogener SZT	X	X		X	Bei funktioneller oder anatomischer Asplenie
Meningokokken (ACWY + B)		X	X		X	Grundimmunisierung plus Booster nach 6 Monaten

Planung: Impfen möglichst früh vor Beginn bzw. kurz vor oder nach nächster Applikation der Krebstherapie.
 Unter CD20-Antikörpern vor Therapiebeginn oder 6 Monate nach Therapieende (Ausnahme COVID-19-Impfung).
 Keine Lebendimpfungen bei Immunsupprimierten (z.B. Masern/Mumps/Röteln).
 Für weitere Informationen: **SOP Klinik I „Impfen in der Hämatologie und Onkologie“**.